



Stepe

Stepe ir dabas zona, kurā aug daudzgadīgas graudzāles, bet nav koku, jo mitrums ir par maz. Stepes plešas Eirāzijā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Tām ir dažādi nosaukumi. Ziemeļamerikā stepes sauc par **prērijām**, bet Dienvidamerikā – par **pampām**.

Stepes atrodas mērenajā un subtropu joslā. Ziema mērenās joslas stepēs ir auksta – gaisa temperatūra var noslīdēt līdz $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vasara ir sausa un karsta ($20\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$). Subtropu joslas stepēs ziema ir maigāka, bet vasara – karstāka. Nokrišņu ir samērā maz.

Augsne ziemā stipri sasalst, bet vasarā – izkalst – organiskās vielas sadalās lēni, un tas veicina trūdvielu uzkrāšanos. Mērenās joslas stepēs ir pasaulē auglīgākā **melnzemes augsne**. Tāpēc stepju iedzīvotāji var nodarboties ar zemkopību. Galvenokārt audzē kviešus un citus graudaugus, kukurūzu, saulgriezes, dārzeņus. Sausākās stepēs iedzīvotāji nodarbojas ar lopkopību – audzē zirgus, govīs, aitas. Lai plašos un līdzenos tīrumus pasargātu no vēja, gar tiem stāda ātri augošu koku, piemēram, papeļu rindas.

Savvaļas augu un dzīvnieku stepēs ir maz, jo zeme lielākoties ir uzarta un tiek izmantota lauksaimniecībā. Stepēs mīt dažādi sīki grauzēji – susliki, kāmjī, murkšķi, lēcējpeles. Eirāzijas stepēs sastopamas antilopes saigas, stepes lapsas, stepes seski, ķirzakas, čūskas, stepes ērglis, lielā sīga. Ziemeļamerikas prērijās dzīvo melnkāju seski, prērijsuņi, koijoti. Dienvidamerikas pampās mīt pampas lapsas, pampas briedīši, pumas, bruņneši, guanako (lamas), nandu.